

مرحله	نوع کود	مقدار	طریقه مصرف	اولویت
آبیاری زمستان	هیومی پتاس ۷۰	۱۰ - ۲۰ کیلوگرم	همراه آب آبیاری	۱
اسفند ماه	روغن ولک + بردوفیکس + اتیون	۲۰ + ۲ + ۱ در هزار	محلول پاشی	۱
	سال - فیت (در زمینهای شور) + نیترات کلسیم	۲۰ + ۵۰ کیلوگرم	همراه آب آبیاری	۱
تورم جوانه	مولیپلکس + پریوریل + روی + کپ	۱ + ۱ + ۲ + ۱ در هزار	محلول پاشی	۱
بعد از گرده افشانی	گس کلسیم- بر + زیمانپلکس + گاری	۲ + ۲ + ۰/۵ در هزار	محلول پاشی	۱
نخودی شدن میوه	کمی + کپ محلول پاشی	۱/۵ + ۱/۵ در هزار	محلول پاشی (هر ماه یکبار)	۱
اولین آبیاری	نیترات کلسیم + آهن	۳ + ۵۰ کیلوگرم در هکتار	همراه آب آبیاری	۱
فندقی شدن	کلسیم- بر + گس ام جی + بلاستر + گاری	۱ + ۲ + ۲ + ۰/۵ در هزار	محلول پاشی	۲
	کلسیم قند الکی + کپ محلول پاشی	۱/۵ + ۱/۵ در هزار	محلول پاشی	۱
	۲۰-۲۰-۲۰ + کپ ریشه	۱۰ + ۴ لیتر	همراه آب آبیاری	۱
اواسط خرداد	۲۰-۲۰-۲۰ + کپ + کمی	۲ + ۱/۵ + ۱/۵ در هزار	محلول پاشی	۱
	۳۰-۵-۱۵ + کپ پودری	۲۰ + ۳ کیلوگرم	همراه آب آبیاری	۱
اواسط مرداد	۳۰-۵-۱۵ + کپ + کمی	۲ + ۱/۵ + ۱/۵ در هزار	محلول پاشی	۱
	کلسیم قند الکی + کپ محلول پاشی	۱/۵ + ۱/۵ در هزار	محلول پاشی	۱
	۳۰-۵-۱۵ + کپ ریشه	۲۰ + ۴ کیلوگرم	همراه آب آبیاری	۱
۲ هفته قبل از برداشت	کپ ریشه + سولوپتاس	۳ + ۴۰ کیلوگرم در هکتار	همراه آب آبیاری	۱
بعد از برداشت و قبل از زرد شدن برگها	گس کلسیم - بر + روی + گاری + کمی	۱/۵ + ۱/۵ + ۰/۵ + ۱/۵ در هزار	محلول پاشی	۱
	نیترات کلسیم + هیومی پتاس	۲۰ + ۳ کیلوگرم در هکتار	همراه آب آبیاری	۱
	سولوپتاس + کپ پودری	۲۰ + ۲ کیلوگرم	همراه آب آبیاری	۱
	بردوفیکس	۲ در هزار	محلول پاشی	۱

تذکر:

* از اختلاط نیترات کلسیم و سال-فیت با ترکیبات حاوی فسفات، در تانک کود اجتناب شود.

** اختلاط هیومیک اسید با ترکیبات سولفاته باعث لخته شدن هیومیک اسید و رسوب آن می شود.