

برنامه غذایی سبب زمینی بهاره با محصولات شرکت تجارت طلائی هنگام (در یک هکتار).

مرحله	نوع کود	مقدار	طریقه مصرف
اولین آبیاری	هیومی پتاس ۷۰ + سال-فیت* + ۱۰-۵۲-۱۰	۱۰ + ۱۰ + ۵ کیلوگرم	همراه آب آبیاری
دومین آبیاری	کلپ ریشه + روی بیوگرین + نیترات کلسیم + اوره**	۱۰۰ + ۵۰ + ۲ + ۵ کیلوگرم	همراه آب آبیاری
قبل از گلدهی	کمبی+ کلپ محلول پاشی + ۲۰-۲۰-۲۰	۲ + ۲+۱ در هزار	محلول پاشی (هر ۱۵ روز یکبار)
	گلکس کلسیم - بر+ زیمانپلکس+ گارپی	۰/۲۵+۱/۵+۱/۵ در هزار	محلول پاشی
	کلپ ریشه + سولفات آمونیوم + نیترات کلسیم	۵۰+۱۰۰+۵ کیلوگرم	همراه آب آبیاری
گلدهی تا یک ماه قبل از برداشت	هیومی پتاس ۷۰ + ۱۵-۵-۳۰ + سولفات آمونیوم	۱۰۰+۱۰+۲ کیلوگرم	همراه آب آبیاری
	کمبی+ کلپ محلول پاشی + ۲۰-۲۰-۲۰	۲ + ۲+۱ در هزار	محلول پاشی (هر ۱۵ روز یکبار)
	گلکس ام-جی + بلاستر	۲+۲ در هزار	محلول پاشی
	کلپ پودری + ۱۲-۰-۴۴	۱۰+۲ کیلوگرم	همراه آب آبیاری
	کلپ محلول پاشی + کلسیم قند الکی	۱,۵ + ۱,۵ در هزار	محلول پاشی
	سولفات پتاسیم	۳۰ کیلوگرم	همراه آب آبیاری

- \*سال- فیت، ترکیب ضد شوری است که در هر ماه می توان ۱۰ لیتر در آب آبیاری استفاده کرد.
- \*\* کودهای ازته به میزان ۳۰۰-۴۰۰ کیلوگرم در طول دوره رشد در آب آبیاری استفاده شود. در زمینهای آهکی ، مصرف سولفات آمونیوم منطقی تر است.
- PH آب آبیاری بهتر است با اسیدها در حدود ۶ تنظیم شود.
- محلول پاشی با آب با EC کمتر از ۱۰۰۰ و با pH حدود ۶ صورت گیرد و از مویانها برای افزایش جذب استفاده شود.

تهیه و تنظیم : بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت تجارت طلائی هنگام - شهریور ۹۸